

Requisitos de vacunación para el año escolar 2017-2018

K.A.R. 28-1-20 detalla las vacunas necesarias para cualquier individuo que asiste a la escuela o a un programa de cuidado de niños operado por una escuela. Aquí abajo están los requisitos para el año escolar indicado. Por favor revíselos con cuidado. El número usual de dosis requeridos están en la lista; sin embargo hay ciertas situaciones que podrían alterar el número de las dosis que un niño necesita. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las vacunas de su niño, contacte al doctor primario de su niño o al departamento local de salud.

Se debe proporcionar a la escuela evidencias de las vacunas antes de asistir al primer día de clases.



Programa de niños de edad de 4 años y menores operado por las escuelas

Vacunas	Se requiere
DTaP/DT (difteria, tétano, tosferina)	4 dosis
IPV (polio)	3 dosis
MMR (sarampión, paperas, rubéola)	1 dosis
Varicella (varicela)	1 dosis*
Hepatitis A	2 dosis
Hepatitis B	3 dosis
Hib (influenza hemofila tipo B)	4 dosis**
Pprevnar (antineumococcica)	4 dosis**
Vacunas adicionales recomendadas por el ACIP No son requeridas para programas de temprana edad	
<ul style="list-style-type: none"> • Rotavirus: Se recomienda tres dosis para los infantes menores de 8 meses de edad. • Vacuna de la influenza (flu): Se recomienda esta vacuna anualmente para todos aquellos de 6 meses de edad y mayores. 	

Kinder - 6to grado

Vacuna	Se requiere
DTaP/DT (difteria, tétano, tosferina)	5 dosis
IPV (polio)	4 dosis***
MMR (sarampión, paperas, rubéola)	2 dosis
Varicella (Varicela)	2 dosis*
Hepatitis B	3 dosis
Vacunas adicionales recomendadas por el ACIP No son requeridas para entrar a la escuela	
<ul style="list-style-type: none"> • Influenza (flu): Se recomienda esta vacuna anualmente para todos los niños de 6 meses de edad y mayores 	



Grados 7-12

Vacuna	Se requiere
Tdap (tétano, difteria, tosferina)	1 dosis~
IPV (polio)	4 dosis ***
MMR (sarampión, paperas, rubéola)	2 dosis
Varicella (varicela)	2 dosis*
Hepatitis B	3 dosis
Vacunas adicionales recomendadas por el ACIP No son requeridas para entrar a la escuela	
<ul style="list-style-type: none"> • Vacuna HPV (Virus del Papiloma Humano): Se recomiendan tres dosis a la edad de 11 años. <i>iHPV es una vacuna para prevenir el cáncer!</i> • Vacuna Meningococcal (Meningitis) : Se recomienda una dosis a la edad de 11 años con otra dosis de refuerzo a los 16 años. • Vacuna de la Influenza (flu): Se recomienda anualmente para todos los niños de 6 meses y mayores. 	

Notas

*La vacuna de la varicela (viruela loca) no es requerida si el niño ha tenido ésta enfermedad y la enfermedad ha sido documentada con la firma de un doctor. Sin esta firma, la vacuna es requerida aún si usted cree que su niño ha tenido la enfermedad de varicela.

**La dosis total que se necesita depende del tipo de vacuna y de la edad que tenía el niño cuando recibió la dosis.

***Todos los alumnos de K—5, todos los alumnos nuevos y los alumnos que actualmente están completando la serie de poliomielitis, deben tener 6 meses de margen entre las últimas dos dosis de la vacuna y una dosis tiene que ser después de su 4to cumpleaños.

~Se requiere que todos los alumnos de los grados de 7—12 tengan una dosis de Tdp (refuerzo contra tétanos, difteria y tosferina) independientemente del intervalo de la última dosis de DTaP (vacuna contra tétanos, difteria y tosferina) o Td (tétanos/difteria).